

## Para Pacientes con Seguro Medico Blue Cross y Administradores de Seguros de Primero

Los seguros médicos de Blue Cross y Administradores de Primero no cubren los servicios de anestesia o sedación para colonoscopias. Se le darán a escoger dos opciones, por favor léalas con cuidado previo a su procedimiento. El personal de enfermeras le contestara sus preguntas a su llegada. **Le aseguramos que cualquiera de las dos opciones que Ud. elija le tomaremos medidas para maximizar su confort y seguridad en todo momento.**

### OPCION # 1

Sedación administrada por el anestesista:

- Propofol es el medicamento utilizado por el anestesista.
- Ud. permanecerá dormido durante el procedimiento.
- No recordara el procedimiento.
- El medicamento desaparece rápidamente.
- Hay menos efectos secundarios.
- Puede tener un costo entre \$300 - \$450 que puede no estar cubierto por su seguro médico y Ud. será responsable del pago.
- La oficina de facturación del hospital puede ayudarle a establecer un plan de pagos.
- El seguro médico puede cubrir el costo si Ud. tiene algunas condiciones médicas.

### OPCION # 2

Sedación administrada por el medico:

- Se utilizara Versed y Fentanyl.
- Puede ser que se despierte y sienta algo del procedimiento, o puede ser que se duerma todo el procedimiento. Es difícil predecir lo que Ud. sentirá en el procedimiento.
- Hay una probabilidad de tener náuseas/vómitos después del procedimiento.
- El médico y la enfermera lo supervisaran durante el procedimiento.
- Este método cubierto por todas las compañías de seguros.
- Si no podemos mantener su comodidad después de administrar la dosis máxima, se llamará a anestesia y se administrará propofol. Usted puede ser responsable de cubrir este costo.

Si tiene preguntas o experimenta problemas durante la preparación llame al Hospital Floyd Valley al teléfono 712-546-3332 o 1800-642-6074 Ext 3332 de las 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Después de este horario llame al 712-546-7871 o 1800-642-6074 para hablar con una enfermera.

## Acceso desde la sala de espera

Estar informado sobre el progreso de nuestros seres queridos es muy importante para su experiencia dentro del hospital. No es necesario pasar incertidumbre acerca del proceso por el que está pasando su familiar.

Ud. podrá abrir la cámara en su teléfono y escanear el código QR para bajar la aplicación de EASE en donde podrá registrar al paciente y añadir contactos.



Estará disponible gratis en Apple Store o Google Play. Necesita ayuda con EASE Llame al 407-308-4399 [www.EASEapplications.com](http://www.EASEapplications.com)

## Video guía de colonoscopia



<https://floydvalley.org/servicios-medicos/cirugias>

## Colonoscopia

Instrucciones para la Preparación del Paciente

LOCAL, CONVENIENT, QUALITY CARE.

# Programación de la colonoscopia

Fecha de la colonoscopia:

---

Horario de llegada:

---

Nombre del cirujano:

---

El día de la colonoscopia entre por el lado Oeste del hospital, o sea por la clínica. Deberá pasar al mostrador a registrarse, después se le llevara a la sala de procedimientos o cirugías que se encuentra en el segundo piso. Tome asiento y espere a que le llamen.

## Ud. Necesitará Comprar lo Siguiente:

- Tabletas de Dulcolax (4 tabletas)
- MiraLAX (tamaño 14 dosis)
- Bebida deportiva (dos botellas de 28 a 32 oz). Si lo prefiere, MiraLAX se puede mezclar con agua o otra bebida líquida transparente.
- Citrato de Magnesio (10 oz) solo en el caso de que se haya hecho una colonoscopia anterior y haya presentado problemas para evacuar heces claras.

## Líquidos Claros

Se considera que un líquido es claro cuando se puede leer algo a través de él por ejemplo: agua, jugo de manzana, refresco, café, bebidas deportivas, miel, paletas, gelatina, caldo de pollo, dulces. **NO UTILICE LIQUIDOS ROJOS NI MORADOS.**

**No coma maíz, nueces o semillas 2 días antes de la preparación intestinal.**

# Si la hora de llegada a la colonoscopia es ANTES de las 12:00 PM

## Un Día Antes:

No coma alimentos sólidos el día antes de la colonoscopia, beba solo líquidos claros. Asegúrese de tomar por lo menos 12 vasos grandes (10-12 oz) de líquidos claros durante el día, además de los líquidos que tome para la preparación. Si se siente con náuseas puede beber menos agua.

### 2:00 – 4:00 PM

- Tome 2 tabletas de Dulcolax

### 3:00 – 5:00 PM

- Mezclar ½ botella de MiraLAX (7 dosis) con una botella grande de bebida deportiva o bebida líquida transparente de su elección. Beber 8 oz. cada 20 minutos hasta que se acabe.

### 6:30 – 8:30 PM

- Tome otras 2 tabletas de Dulcolax.
- Mezclar ½ botella de MiraLAX (7 dosis) con una botella grande de bebida deportiva o bebida líquida transparente de su elección. Beba 8 onzas cada 20 minutos hasta que se acabe.
- Si tiene historia de estreñimiento o ha tenido dificultad para vaciar sus intestinos con heces claras en alguna colonoscopia anterior beba una botella de citrato de magnesio (10oz).
- Deje de beber líquidos claros 4 horas antes de su llegada.

\*Ud. puede empezar su preparación 2 horas antes si es que así lo desea.

# Si la hora de llegada de su colonoscopia es DESPUES de las 12:00 PM

## Un Día Antes de la Colonoscopia:

Coma un desayuno ligero un día antes de su colonoscopia. Por ejemplo una pieza de pan tostado y un huevo. No coma nada sólido después del medio día antes de la colonoscopia. Siga una dieta a base de líquidos claros. Asegúrese de tomar por lo menos 10 a 12 vasos grandes (10-12 oz) de líquidos claros durante el día además de los líquidos que requiere la preparación. Si Ud. se siente con náuseas puede beber menos agua.

### 4:00 – 6:00 PM

- Tome 2 tabletas de Dulcolax. Para la cena dieta de líquidos claros no coma nada sólido.

### 5:00 – 7:00 PM

- Mezclar ½ botella de MiraLAX (7 dosis) con una botella grande de bebida deportiva o bebida líquida transparente de su elección. Beber 8 oz. cada 20 minutos hasta que se acabe.

## El Día de la Colonoscopia:

### 4:00 – 6:00 AM

- Tome otras 2 tabletas de Dulcolax. Mezclar ½ botella de MiraLAX (7 dosis) con una botella grande de bebida deportiva o bebida líquida transparente de su elección. Beber 8 oz. cada 20 minutos hasta que se acabe.
- Si Ud. tiene historial de estreñimiento o dificultad para obtener heces claras en una colonoscopia previa tome una botella de citrato de magnesio (10 oz).
- Ese día solamente líquidos claros yetenga estos 4 horas antes de su llegada.

# Medicamentos

- Descontinúe el uso de productos a base de aspirina como él (Excedrin) El Ibuprofeno y el Hierro descontinúe 1 semana antes de su procedimiento.
- Detenga los adelgazantes de sangre varios días antes de la colonoscopia. Es importante checar con su médico que le ha prescrito estos medicamentos si puede dejarlos de manera segura.
- Consulte con su médico sobre sus medicamentos para la diabetes.
- Puede tomar su medicamento para la presión arterial normalmente, antes de la colonoscopia.
- Detenga sus medicamentos para bajar de peso una semana antes de la colonoscopia.
- Traiga una lista con todos los medicamentos o traiga las botellas de estas para su cita.

# Información

- No use productos de tabaco el día de su colonoscopia incluyendo cigarro electrónico y tabaco.
- **No se le permitirá manejar el día de la colonoscopia, puede volver a manejar al día siguiente de su procedimiento.**
- Su estancia en el hospital será de mínimo de 2 horas.
- Es su responsabilidad checar con su compañía de seguros médicos si el procedimiento de la colonoscopia se necesita autorización previa.